

# Abnormal Involuntary Movement Rating Scale (AIMS)

Verkorte versie 7 items

Naam patiënt: .....	Geboortedatum: .....
Naam onderzoeker: .....	Datum: .....

Gelaats- en mondbewegingen	Geen	Minimaal	Licht	Middelmatig	Zwaar
MIMISCHE SPIEREN, bijvoorbeeld bewegingen van het voorhoofd, wenkbrauwen, rondom de ogen, wangen, alsmede fronsen, knipogen, glimlachen, grimasseren.	0	1	2	3	4
LIPPEN EN RONDOM DE MOND, bijvoorbeeld lippen spitsen, smakken, mummelen.	0	1	2	3	4
KAAK, bijvoorbeeld bijten, kauwen, mond steeds openen, zijwaartse bewegingen.	0	1	2	3	4
TONG. Scoor alleen de toename in beweging in en uit de mond, niet het onvermogen de beweging te onderdrukken.	0	1	2	3	4

Bewegingen van de ledematen	Geen	Minimaal	Licht	Middelmatig	Zwaar
BOVENSTE LEDEMATEN (armen, polsen, handen en vingers). <u>Zowel</u> choreatische bewegingen (bijvoorbeeld snelle, objectief zinloze, onregelmatige, spontane bewegingen) <u>als</u> athetotische bewegingen (bijvoorbeeld langzame, onregelmatige langzame golfbewegingen). Tremor niet meetellen (ritmisch, regelmatig, herhaald aanwezig).	0	1	2	3	4
ONDERSTE LEDEMATEN (benen, knieën, enkels, tenen), bijvoorbeeld zijwaarts bewegen van de knieën, voet spannen, met voorvoet of hiel op de grond tikken.	0	1	2	3	4

Rompbewegingen	Geen	Minimaal	Licht	Middelmatig	Zwaar
NEK, SCHOUDERS, HEUPEN, bijvoorbeeld schokken, draaien, bekken kantelen, samentrekken	0	1	2	3	4

## Referenties:

- Guy, W. ECDEU Assessment Manual for Psychopharmacology. US Department of Health, Education, and Welfare, District of Columbia; Washington: 1976.
- Gharabawi GM, Bossie CA, Lasser RA et al. Abnormal Involuntary Movement Scale (AIMS) and Extrapyramidal Symptom Rating Scale (ESRS): cross-scale comparison in assessing tardive dyskinesia. Schizophr Res 2005; 77(2-3):119-28