

# Abnormal Involuntary Movement Rating Scale (AIMS)

Verkorte versie 7 items

Naam patiënt: .....	Geboortedatum: .....
Naam onderzoeker: .....	Datum: .....

Gelaats- en mondbewegingen	Geen	Minimaal	Licht	Middelmatig	Zwaar
MIMISCHE SPIEREN, bijvoorbeeld bewegingen van het voorhoofd, wenkbrauwen, rondom de ogen, wangen, alsmede fronsen, knipogen, glimlachen, grimasseren.	0	1	2	3	4
LIPPEN EN RONDOM DE MOND, bijvoorbeeld lippen spitsen, smakken, mummelen.	0	1	2	3	4
KAAK, bijvoorbeeld bijten, kauwen, mond steeds openen, zijwaartse bewegingen.	0	1	2	3	4
TONG. Scoor alleen de toename in beweging in en uit de mond, niet het onvermogen de beweging te onderdrukken.	0	1	2	3	4

Bewegingen van de ledematen	Geen	Minimaal	Licht	Middelmatig	Zwaar
BOVENSTE LEDEMATEN (armen, polsen, handen en vingers). Zowel choreatische bewegingen (bijvoorbeeld snelle, objectief zinloze, onregelmatige, spontane bewegingen) als athetotische bewegingen (bijvoorbeeld langzame, onregelmatige langzame golfbewegingen). Tremor niet meetellen (ritmisch, regelmatig, herhaald aanwezig).	0	1	2	3	4
ONDERSTE LEDEMATEN (benen, knieën, enkels, tenen), bijvoorbeeld zijwaarts bewegen van de knieën, voet spannen, met voorvoet of hiel op de grond tikken.	0	1	2	3	4

Rompbewegingen	Geen	Minimaal	Licht	Middelmatig	Zwaar
NEK, SCHOUDERS, HEUPEN, bijvoorbeeld schokken, draaien, bekken kantelen, samentrekken	0	1	2	3	4

## Referenties:

- Guy, W. *ECDEU Assessment Manual for Psychopharmacology*. US Department of Health, Education, and Welfare, District of Columbia; Washington: 1976.
- Gharabawi GM, Bossie CA, Lasser RA et al. *Abnormal Involuntary Movement Scale (AIMS) and Extrapyramidal Symptom Rating Scale (ESRS): cross-scale comparison in assessing tardive dyskinesia*. *Schizophr Res* 2005; 77(2-3):119-28